



SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUEIMADURAS
PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS

Orientações para vítimas de QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU

A sua queimadura foi moderada, mas pode ser tratada em casa. Para diminuir a chance de ficar cicatriz você deve tomar os seguintes cuidados:

Primeira semana:

- Realizar limpeza e aplicação do creme de Sulfadiazina de Prata 1% duas vezes ao dia por 7 (sete) dias.

Segunda à sexta – no centro de saúde

Sábado, domingo e feriados – nas UPAs

- Evite expor o curativo a sujeira/umidade.
- Vá ao posto de saúde com a carteira de vacinação para verificar se você precisa receber o reforço da vacina contra o tétano.
- Retorne antes se estiver com cheiro ruim ou saindo pus.

Na segunda semana, para melhorar a coceira e a descamação, aplique óleo mineral a cada 12 horas.

Da terceira semana em diante:

- filtro solar (FPS 30 ou maior) durante o dia.
- hidratante neutro todas as noites até a melhora completa.

Você deve ser reavaliado em 3 semanas:

Local: _____
Data: ___/___/___
Hora: _____

Em caso de dúvidas procure o serviço de saúde mais próximo.

Assinatura e Carimbo do Emitente